



Du ser skillnaden!

Patienten känner den



HUMIRA® (ADALIMUMAB) är en TNF- α -hämmare som förbättrar den fysiska funktionen hos patienter med ankyloserande spondylit genom att ge en snabb och bibehållen reduktion av smärta och inflammation.

Humira behöver bara ges subkutan var 14:e dag och sprutan är färdig att användas, direkt.

Indikation Reumatoid artrit – Humira i kombination med metotrexat är indicerat för behandling av måttlig till svår, aktiv reumatoid artrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel inklusive metotrexat inte haft tillräcklig effekt. **Behandling av svår, aktiv och progresserande reumatoid artrit hos vuxna som inte tidigare behandlats med metotrexat.** **Indikation Psoriasisartrit** – Humira är indicerat för behandling av aktiv och progresserande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. **Indikation Ankyloserande spondylit** – HUMIRA är indicerat för behandling av vuxna med svår aktiv ankyloserande spondylit när annan konventionell behandling inte haft tillräcklig effekt. **Förpackningar:** Injektionsvätska, lösning, färdfylld spruta 2x40 mg opalescent lösning. För mer information se www.fass.se. **Referens:** Efficacy and Safety of Adalimumab in Patients with Ankylosing Spondylitis: Results of a randomized placebo controlled trial (ATLAS). Van der Heijde D, et al. *Arthritis & Rheumatism*. 2006 Jun 26;54(7):2136–2146.

HUMIRA®
adalimumab

Ge effekt på livet