

Kom igång med Mounjaro® KwikPen®

en gång i veckan
mounjaro®
(tirzepatid) injektion

A Lilly Medicine

Underhållsdos redan efter 4 veckor:

1. Starta med 2,5 mg / vecka. Efter 4 veckor öka till:
2. Underhållsdos 5 mg / vecka

För patienter i behov av mer effekt öka dosen i steg om 2,5 mg

Se demonstrationsvideo
& ladda ned material:



Förpackningar som tillhandahålls av Lilly (en månads förbrukning)

Varunummer	Produkt	Ca pris på apotek*
447165	Mounjaro KwikPen, 2,5 mg	2000 kr
478513	Mounjaro KwikPen, 5 mg	2700 kr
501909	Mounjaro KwikPen, 7,5 mg	3800 kr
197041	Mounjaro KwikPen, 10 mg	3800 kr
456696	Mounjaro KwikPen, 12,5 mg	4900 kr
519495	Mounjaro KwikPen, 15 mg	4900 kr

- Förpackningarna finns tillgängliga att beställa från Tamro och få levererade inom 24 timmar.
- Mounjaro tillhandahålls även av parallellimportörer vars tillgänglighet och pris vi inte kan uttala oss om.
- Kanyler medföljer inte förpackningen utan måste förskrivas eller köpas på apotek. Mounjaro KwikPen är kompatibel med standardkanyler från allmänt kända leverantörer som t.ex. BD i valfri längd och tjocklek.
 - Exempel på längder: 4 mm, 5 mm, 6 mm
 - Exempel på diameter: 29G, 31G, 32G, 33G, 34G

* Då Mounjaro inte ingår i subventionen är det fri prissättning, varför vi inte kan uttala oss om det exakta priset för varje enskilt apotek.



▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Mounjaro (tirzepatid), Diabetesmedel, övriga blodglukossänkande läkemedel, ATC-kod A10BX16 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg KwikPen injektionsvätska, lösning i förfylld flerdos injektionspenna alternativt injektionsvätska, lösning i endos injektionsflaska.

Receptbelagt läkemedel (Rx), Ej inom förmånen (EF)

Indikationer: Typ 2-diabetes: Mounjaro är avsett för behandling av vuxna, ungdomar och barn från 10 år och äldre med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes som ett komplement till kost och motion, som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer eller som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

Viktkontroll: Mounjaro är avsett som komplement till lågkaloridiet och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll, inklusive viktninskning och vikthantering, hos vuxna med ett initialt BMI på ≥ 30 kg/m² (obesitas) eller ≥ 27 kg/m² till < 30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet (t.ex. hypertoni, dyslipidemi, obstruktiv sömnapné, kardiovaskulär sjukdom, prediabetes eller typ 2-diabetes).

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Varningar och försiktighet: Tirzepatid har inte studerats hos patienter med pankreatit i anamnesen och ska användas med försiktighet till dessa patienter. Alla patienter bör informeras om

symtomen på akut pankreatit. Om pankreatit misstänks ska tirzepatid sättas ut och inte återinsättas om diagnosen bekräftas. Patienter som får tirzepatid i kombination med en insulinsekretagog eller insulin kan löpa ökad risk för hypoglykemi. Denna risk kan reduceras genom att sänka dosen av insulinsekretagogen eller insulin. Tirzepatid har förknippats med biverkningar i magtarmkanalen, som kan orsaka uttorkning, vilket kan leda till försämrad njurfunktion inklusive akut njursvikt. Patienter ska informeras om den potentiella risken för uttorkning och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika vätskebrist. Tirzepatid har inte studerats hos patienter med svår gastrointestinal sjukdom, inklusive svår gastropares, och ska användas med försiktighet till dessa patienter. Beakta att förlängsammat ventrikeltömning kan öka risken för aspiration i samband med generell anestesi och djup sedering. Tirzepatid har inte studerats hos patienter med icke-proliferativ diabetisk retinopati som kräver akut behandling, proliferativ diabetisk retinopati eller diabetiskt makulaödem och ska användas med försiktighet och lämplig övervakning till dessa patienter.

Fertilitet, graviditet och amning: Tirzepatid ska inte användas under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel. Tirzepatid ska utsättas minst en månad före planerad graviditet. Användning av tirzepatid i samband med amning rekommenderas inte.

Datum för översyn av produktresumén: 2026-01-22

För ytterligare information och priser se www.fass.se

Mounjaro är inte subventionerat