



Mounjaro vid viktkontroll

Mounjaro KwikPen® tillhandahålls i styrkorna: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg och 15 mg

Mounjaro minimiinformation


Indikation¹

Mounjaro är avsett som komplement till lågkaloridiet och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll, inklusive viktninskning och vikthantering, hos

Top

vuxna med ett initialt BMI (kroppsmasseindex) på

- $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ (obesitas) eller
 - $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ till $< 30 \text{ kg/m}^2$ (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet (t.ex. hypertoni, dyslipidemi, obstruktiv sömnapné, kardiovaskulär sjukdom, prediabetes eller diabetes mellitus typ 2).
-



Effekt

Läs mer




Dosering och administrering

Läs mer



Biverkningar


Läs mer



Patientmaterial

Läs mer


Mounjaro förbättrar viktkontrollen genom flera mekanismer ^{1,2}



Påverkar energiomsättning och aptitreglering.




Minskar födointaget genom bl.a. minskad hunger och ökad mättnadskänsla.



Sänker kroppsvikten och minskar kroppens fettmassa inklusive visceralt fett.

Mounjaro ger signifikant viktnedgång^{1,2}


SURMOUNT-1: resultat efter behandling med Mounjaro i 72 veckor



* $p < 0,001$ jämfört med placebo. Baserat på Mounjaro (tirzepatid) produktresumé, www.fass.se

SURMOUNT-1 studiedesign ²

Mounjaro utvärderades i en fas 3-studie under 72 veckor



- SURMOUNT-1 inkluderade 2539 vuxna med ett BMI på $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ eller ett BMI på $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ och minst 1 viktrelaterad komplikation, exklusive typ 2-diabetes.
- Deltagarna i alla grupper, inklusive placebo, instruerades om en kalorireducerad diet (minus 500 kalorier per dag) och ökad fysisk aktivitet (minst 150 minuter per vecka).

BMI= kroppsmasseindex

QW=en gång i veckan

Primärt effektmått MTD (15 eller 10 mg)^{1,2}

- Procentuell förändring från utgångsvärdet till vecka 72.
- Andel studiedeltagare med viktninskning på $\geq 5\%$ vid vecka 72.


Viktiga sekundära effektmått^{1,2}

- Förändring från utgångsvärdet till vecka 72 i systoliskt blodtryck, fasteinulin och lipidnivåer (alla doser kombinerade).
 - Andel med viktninskning på $\geq 10\%$, $\geq 15\%$ och $\geq 20\%$ vid vecka 72 (10 mg och/eller 15 mg).
 - Ändring i midjemått från utgångsvärdet till vecka 72 (10 mg och/eller 15 mg).
-
-

I SURMOUNT-5:

Mounjaro® (15 mg eller 10 mg) visar
överlägsen viktnedgång jämfört med Wegovy®
(2,4 mg eller 1,7 mg)


Viktförändring över tid.



*SURMOUNT-5: Högsta tolererbara dos av Mounjaro (15 mg eller 10 mg), jämfört med högsta tolererbara dos vid studietillfället för Wegovy (2,4 mg eller 1,7 mg), ($p < 0,001$). Wegovy 7,2 mg utvärderades således inte i denna studie.

**MTD= Högsta tolererbara dos

SURMOUNT-5 Studiedesign ³



I SURMOUNT-5 studien randomiserades 751 vuxna patienter med obesitas ($\text{BMI} \geq 30 \text{ kg/m}^2$) eller övervikt ($\text{BMI} \geq 27 \text{ kg/m}^2$ till $< 30 \text{ kg/m}^2$) med minst en viktrelaterad komorbiditet till antingen tirzepatid 15 mg eller till semaglutid 2,4 mg en gång i veckan och följdes i 72 veckor. Om deltagaren inte tolererade högsta läkemedelsdos, reducerades dosen till tirzepatid 10 mg eller semaglutid 1,7 mg en gång i veckan. Patienterna fick rådgivning om en kalorireducerad kost och ökad fysisk aktivitet under hela studien. Studiedeltagarna, varav 64,7 % kvinnor, hade en medelålder på 44,7 år och ett genomsnittligt BMI på $39,4 \text{ kg/m}^2$.

Primärt effektmått ^{1,3}

- Procentuell vikt förändring från utgångsvärdet till vecka 72.

Viktiga sekundära effektmått ^{1,3}

- Andel med viktninskning på $\geq 10\%$, $\geq 15\%$, $\geq 20\%$ och $\geq 25\%$ vid vecka 72.
 - Ändring i midjemått från utgångsvärdet till vecka 72.
-

Mounjaro KwikPen

Mounjaro KwikPen är en förfylld injektionspenna som innehåller 4 doser - en dos tas en gång i veckan.



Mounjaro® KwikPen®
(tirzepatid)
Injektionsvätska, lösning



ANVÄNDARINS'

FÖR DIG SOM




Mounjaro Demonstrationsvideo

Individanpassad dosering med Mounjaro

Mounjaro tas en gång i veckan och kan tas med eller utan mat.

- Mounjaro KwikPen är en förfylld injektionspenna som innehåller 4 doser. En dos tas en gång i veckan.
- Startdosen är 2,5 mg en gång i veckan. Efter 4 veckor ska dosen ökas till 5 mg en gång i veckan.
- En dos ska alltid tas i minst 4 veckor innan den höjs till nästa dos.



Kanyler



Vanliga biverkningar^{1,2}

De vanligaste rapporterade biverkningarna var från magtarmkanalen och var i allmänhet lindriga till måttliga. Gastrointestinala biverkningar förekom primärt i samband med doshöjning och minskade med tiden.

Vanliga biverkningar rapporterade i SURMOUNT-1				
	Mounjaro 5 mg (n=630)	Mounjaro 10 mg (n=636)	Mounjaro 15 mg (n=630)	Placebo (n=643)
Illamående	25%	33%	31%	9%
Diarré	19%	21%	23%	7%
Förstoppning	17%	17%	12%	6%
Dyspepsi	9%	10%	11%	4%
Kräkningar	8%	11%	12%	2%
Minskad aptit	9%	11%	9%	3%


Avbrott pga biverkningar				
	Mounjaro 5 mg (n=630)	Mounjaro 10 mg (n=636)	Mounjaro 15 mg (n=630)	Placebo (n=643)
Avbröt behandlingen pga biverkningar (%)	4.3%	7.1%	6.2%	2.6%
Avbröt behandlingen pga GI-biverkningar (%)	1.9%	4.4%	4.1%	0.5%

Följande råd kan hjälpa din patient vid illamående eller andra mag- och tarmbesvär.

- Äta mindre portioner - istället för tre huvudmål kan patienten prova att äta fler fast mindre måltider.
- Undvika fet mat som exempelvis friterad mat.
- Lyssna på kroppen och avsluta måltiden vid mättnadskänsla.

Varningar och försiktigheter	▼
Fertilitet, graviditet och amning	▼

Ladda ned patientmaterial för Mounjaro



FÖR VIKTKONTROLL

EN GUIDE TILL DIG SOM BEHANDLAS MED

**MOUNJARO® (tirzepatid)
KWIKPEN®**

Läs alltid noggrant igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen.

Här kan du ladda ner en guide med användbar information för dina patienter som ska starta behandling med Mounjaro

[Ladda ned](#)

Registrera dig för aktuella föreläsningar inom obesitas och typ 2-diabetes genom att skanna QR koden eller klicka på länken nedan.

[Klicka här](#)

Mer information



Håll dig uppdaterad om Mounjaro och utbildningar

Fyll i ditt samtyckte till e-post från Lilly nedan för att hålla dig uppdaterad om aktuell produktinformation och relevanta utbildningar.

[Klicka här](#)



Mounjaro vid typ 2-diabetes

Lär dig mer om indikation, studieresultat och biverkningar för Mounjaro för typ 2-diabetes

[Klicka här](#)

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Mounjaro (tirzepatid), Diabetesmedel, övriga blodglukossänkande läkemedel, ATC-kod A10BX16

2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg KwikPen injektionsvätska, lösning i förfylld flerdos

injektionspenna alternativt injektionsvätska, lösning i endos injektionsflaska.

Receptbelagt läkemedel (Rx), Ej inom förmånen (EF)

Indikationer: Typ 2-diabetes: Mounjaro är avsett för behandling av

vuxna, ungdomar och barn från

10 år och äldre med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes som ett komplement till kost och motion, som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer eller som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

Viktkontroll: Mounjaro är avsett som komplement till lågkaloridiet och ökad fysisk aktivitet för

viktkontroll, inklusive viktminskning och vikthantering, hos vuxna med ett initialt BMI på ≥ 30 kg/m² (obesitas) eller ≥ 27 kg/m² till < 30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet (t.ex. hypertoni, dyslipidemi, obstruktiv sömnapné, kardiovaskulär sjukdom, prediabetes eller typ 2-diabetes).

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Varningar och försiktighet: Tirzepatid har inte studerats hos patienter med pankreatit i anamnesen

och ska användas med försiktighet till dessa patienter. Alla patienter bör informeras om symtomen på akut pankreatit. Om pankreatit misstänks ska tirzepatid sättas ut och inte återinsättas om diagnosen bekräftas. Patienter som får tirzepatid i kombination med en insulinsekretagog eller insulin kan löpa

ökad risk för hypoglykemi. Denna risk kan reduceras genom att sänka dosen av insulinsekretagogen

eller insulin. Tirzepatid har förknippats med biverkningar i magtarmkanalen, som kan orsaka

uttorkning, vilket kan leda till försämrad njurfunktion inklusive akut njursvikt. Patienter ska

informeras om den potentiella risken för uttorkning och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika

vätskebrist. Tirzepatid har inte studerats hos patienter med svår gastrointestinal sjukdom, inklusive

svår gastropares, och ska användas med försiktighet till dessa patienter. Beakta att förlångsammad

ventrikeltömning kan öka risken för aspiration i samband med generell anestesi och djup sedering.

Tirzepatid har inte studerats hos patienter med icke-proliferativ diabetisk retinopati som kräver akut

behandling, proliferativ diabetisk retinopati eller diabetiskt makulaödem och ska användas med

försiktighet och lämplig övervakning till dessa patienter.

Fertilitet, graviditet och amning: Tirzepatid ska inte användas under graviditet eller av kvinnor i

fertil ålder som inte använder preventivmedel. Tirzepatid ska utsättas

minst en månad före planerad graviditet. Användning av tirzepatid i samband med amning kan övervägas.

Datum för översyn av produktresumén: 2026-01-29

För ytterligare information och priser se www.fass.se

Mounjaro är inte subventionerat

Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00,
www.lilly.com/se

Referenser:

1. Mounjaro (tirzepatid) produktresumé, www.fass.se.
2. Jastreboff AM et al. N Engl J Med.2022;387:205-216.
3. Aronne LJ et al N Engl J Med 2025;393:26-36

PP-TR-SE-0065 | April 2026

[Kontakta oss](#)

[Användarvillkor](#)

[Sekretesspolicy](#)

[Användarvänlighet](#)

[Sitemap](#)

[Cookieinställningar](#)

[Copyright © 2026 Eli Lilly and Company. All rights reserved.](#)

PP-MG-SE-0142 Mars 2026

