


# Obgemma<sup>TM</sup>

## vibegron

Select a treatment  
designed for your  
OAB patients

- *Shown efficacy on key OAB symptoms\**
- *No blood pressure warning\*\**
- *One dose, once daily. Crushable tablets\*\*\**

Obgemma<sup>TM</sup> is indicated for symptomatic treatment of adult patients with overactive bladder (OAB) syndrome.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

**Obgemma<sup>®</sup>** (vibegron), 75 mg filmdragerade tabletter, Rx, F, Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot inkontinens och för kontroll av miktionsfrekvens. ATC-kod: G04BD15.  
**Indikation:** Symtomatisk behandling av överaktiv blåsa (OAB) hos vuxna. **Varningar och försiktighet:** Urinretention har rapporterats hos patienter som tar vibegron. Risken för urinretention kan öka hos patienter med obstruktion av de nedre urinvägarna och även hos patienter som tar muskeltantagonist-läkemedel samtidigt med behandling med vibegron. Tecken och symptom på urinretention bör övervakas före och under behandlingen med vibegron. Behandling med vibegron ska avbrytas hos patienter som utvecklar urinretention. Vibegron är ett substans för P-glykoprotein (P-gp). Potentialen för interaktion med P-gp bör beaktas när vibegron ges i kombination med känsliga P-gp-substrat med snävt terapeutiskt index, t.ex. dabigatranetexilat, apixaban eller rivaroxaban. Vibegron rekommenderas inte till patienter med terminal njursjukdom eller patienter med gravt nedsatt leverfunktion. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varje filmdragerad tablet innehåller 1,5 mg laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption. **Fertilitet, graviditet och amning:** Vibegron rekommenderas inte till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel. Vibegron rekommenderas inte under graviditet. När graviditet planeras eller diagnostiseras ska behandlingen med vibegron avbrytas. Vibegron ska inte användas under amning. **Kontakt:** Pierre Fabre Pharma Norden AB, infoorden@pierre-fabre.com, www.pierrefabrepharma.se. Datum för översyn av produktresumén: 2025-02-17 För fullständig information och pris vänligen se [www.fass.se](http://www.fass.se).

Obgemma<sup>®</sup> and Obgemma<sup>™</sup> are trademarks owned by Urovant Sciences GmbH.

\*Increased day time frequency, Urge Urinary Incontinence (UUI) episodes, Urgency episodes, \*\*Tablets may also be crushed, mixed with a tablespoon of soft food and taken immediately with a glass of water 1. Produktresumé Obgemma<sup>™</sup> (vibegron) 2. Weber MA et al. Effects of vibegron on ambulatory blood pressure in patients with overactive bladder: results from a double-blind, placebo controlled trial. Blood Pressure Monitoring 2022;27(2):128-134.

**Pierre Fabre**  
LABORATOIRES