



by Mylan Women's Healthcare

Till dig som har fått Femoston eller Femostonconti förskrivet.

Femoston och Femostonconti är preparat i tablettform för hormonersättningsbehandling hos kvinnor med östrogenbristsymtom i samband med menopaus. Basen för framställningen tas från roten av en jansväxt (Dioscorea), även kallad brödrott på svenska. Molekylen modifieras sedan kemiskt i framställningsprocessen. Innehållet är östrogen, i form av estradiol, och progestogen i form av dydrogesteron. Läkemedlen har funnits i Europa sedan 1996.

Femoston är en sekventiell behandling som är avsedd att användas tidigare i menopausen, vilket innebär att östrogen tas utan avbrott under varje 28-dagars cykel och dydrogesteron tas sekventiellt, dvs under de sista 14 dagarna i varje 28-dagars cykel. Den sekventiella behandlingen kan ge månatliga blödningar.

Femostonconti är en kontinuerlig behandling som är avsedd att användas först när menopaus fastställts vilket innebär att östrogen och dydrogesteron tas varje dag utan avbrott under en 28-dagars cykel. Den kontinuerliga behandlingen ger ingen månatlig blödning.

Både Femoston och Femostonconti ska tas en gång dagligen utan avbrott mellan förpackningarna.



Femoston 1mg / 10mg



Femoston 2mg / 10mg



Femostonconti 0,5mg / 2,5mg



Femostonconti 1mg / 5mg

Tag noga del av bipacksedeln för fullständig information om biverkningar av Femoston och Femostonconti.

Om du påbörjar hormonbehandling en längre tid efter menopaus kan man i början få bröstspänningar, som oftast minskar och försvinner efter en tids behandling. Även andra PMS eller mensrelaterade symtom är vanligt förekommande, så som huvudvärk, magsmärtor/ryggsmärtor, illamående, trötthet, orkeslöshet, nedstämdhet och oro. Kvinnor som tidigare upplevt migrän i samband med PMS eller mens kan åter drabbas av migrän. Som patient ska du vara medveten om att andra biverkningar kan förekomma och att du då kan kontakta din läkare för att rådgöra om du ska avbryta behandlingen. Biverkningar som kan förekomma är t.ex: svampinfektioner i underlivet, yrsel, hudreaktioner, viktökning, oregelbundna blödningar.

Kontakta omedelbart din läkare vid: Graviditet, oförklarlig vaginal blödning, gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor), om blodtrycket stiger kraftigt (kan ge huvudvärk, trötthet och yrsel), tecken på blodpropp (migränliknande huvudvärk för första gången, plötslig bröstsmärta, andningssvårigheter eller smärtsam svullnad och rodnad på benen).

Femoston® (1 mg/10 mg och 2mg/10 mg 17- β -estradiol/dydrogesteron, filmdragerad tablett). Rx, EF. **ATC kod:** G03FB08. **Indikation:** Hormonell substitutionsbehandling av östrogenbristsymtom till kvinnor efter menopaus med mer än 6 månader sedan senaste menstruation. Förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för framtida frakturer, om de inte tål eller har kontraindikationer mot andra läkemedel godkända för att förebygga osteoporos. **Varningar och försiktighet:** Noggrann anamnes före initiering samt värdering av risk/nytta balansen minst en gång per år. **Produktnamn senast uppdaterad:** 2019-07-01. **För ytterligare information och priser:** www.fass.se. **Marknadsförs av:** Mylan AB, www.mylan.se, inform@mylan.se

Femostonconti (0,5 mg/2,5 mg och 1 mg/5 mg 17- β -estradiol/dydrogesteron, filmdragerad tablett). Rx, EF. **ATC kod:** G03FA14. **Indikation:** Hormonell substitutionsbehandling av östrogenbristsymtom till kvinnor efter menopaus med mer än 12 månader sedan senaste menstruation. Den högre styrkan även förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för framtida frakturer, om de inte tål eller har kontraindikationer mot andra läkemedel godkända för att förebygga osteoporos. **Varningar och försiktighet:** Noggrann anamnes före initiering samt värdering av risk/nytta balansen minst en gång per år. **Produktnamn senast uppdaterad:** 2019-07-18. **För ytterligare information och priser:** www.fass.se. **Marknadsförs av:** Mylan AB, www.mylan.se, inform@mylan.se