

GE JÄRNET!

KRONISKA SJUKDOMAR KAN LEDA TILL JÄRNBRIST

Vid funktionell järnbrist är upptaget av järn i tarmen hämmat och förrådsjärnet kan inte utnyttjas. Det är vanligt vid kroniska sjukdomar, som hjärtsvikt, nedsatt njurfunktion, IBD och inflammatoriska tillstånd. Funktionell järnbrist påvisas säkrast genom att mäta järnmätnaden.

ETT BRA HB KAN DÖLJA JÄRNBRIST

Järnförråden kan också minska under längre tid utan att det syns på Hb-värdet. Därför är det viktigt att inte bara mäta Hb vid misstänkt järnbrist – utan även förrådsjärnet (ferritinprov) och järnmätnaden (transferrinmätnaden).

JÄRNBRIST ÄR ENKELT ATT BEHANDLA

Järnbrist behandlas i första hand med järntabletter. I andra hand ges intravenöst järn, om järntabletter inte ger tillräcklig effekt eller inte kan användas – eller om det finns behov av att ge järn snabbt. En behandling med intravenöst järn tar omkring 15 minuter och ger mätbar förändring i benmärgen efter 8 timmar.

*Ferinject® (ferric carboxymaltose) är världens mest använda och studerade högdos IV-järn för behandling av järnbrist.**



Tillgängligt patientmaterial:

Lilla Järnkollsboken och kollajärnet.se

* Vifor Pharma: Årsredovisning 2020.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Ferinject (järnkarboxymaltos) 50 mg Fe/ml, injektions-/infusionsvätska, lösning ATC-kod: B03AC Medel vid järnbristanemier, järn, parenteralt preparat, Rx (F).
Ferinject ingår i läkemedelsförmånen med begränsningen: subventioneras inte för patienter i hemodialys. Indikation: för behandling av järnbrist, när orala järnpreparat är ineffektiva, inte kan användas eller det finns ett kliniskt behov att ge järn snabbt.



Diagnosen järnbrist måste vara baserad på laboratorieprov. **Kontraindikationer:** Anemi som inte tillskrivs järn-

brist t.ex. annan mikrocytisk anemi, tecken på järnöverbelastning eller störningar i utnyttjandet av järn. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller överkänslighet mot andra parenterala järnprodukter. **Varningar och försiktighet:** Parenteralt administrerade järnpreparat kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner. Det har förekommit rapporter om överkänslighetsreaktioner som har utvecklats till Kounis syndrom. Parenteralt administrerade järnpreparat kan orsaka hypofosfatemi. Hos patienter med leverdysfunktion skall parenteralt järn endast administreras efter en noggrann nytta/riskbedömning. Parenteralt järn måste användas med försiktighet vid akut eller kronisk infektion, astma, eksem

eller atopiska allergier. Användning av Ferinject har inte studerats hos barn och rekommenderas därför inte till barn under 14 år. **Graviditet och amning:** Det finns begränsade data från användningen av Ferinject hos gravida kvinnor, därför krävs en noggrann nytta/riskbedömning före användning under graviditet. Skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt. För ytterligare information, samt upplysningar om förpackningar och priser, se www.fass.se. Produktresumén uppdaterad 2021-09-07.

Kontakt: Vifor Pharma Nordiska AB, Gustav III:s Boulevard 46, 169 73 Solna, Sverige. Tel. 08-55806600. Email: info.nordic@viforpharma.com.

SE-FCM-2100093