# eView

a bulletin by AbbVie

## Andra patientfallet ute nu!

**Vårt första patientfall om KLL som vi lanserade i förra eView, fick höga betyg av de som gjort fallet! Man tyckte det var intressant och majoriteten skulle rekommendera det till en kollega.**

Nu släpper vi det andra av fyra interaktiva patientfall. Denna gång är det Lena, 61 år som du får följa. Lena har sökt akut hjälp på vårdcentralen då hon har haft svår hosta och feber i flera dagar. Testa dina kunskaper om KLL och se om du kan hjälpa Lena.

- **Ta del av fallet om Lena redan idag!**
- **Missade du fallet om Erik, 72 år med knölar på halsen? Här får du en ny chans!**

*Båda fallen är framtagna av Professor Emerita Eva Kimby, Karolinska Institutet Solna.*

## Behandling av KLL – intervju med Mattias Mattsson

Ta del av andra delen av intervjun om behandling av KLL med överläkare Mattias Mattsson, Uppsala. Missade du första delen av intervjun kan du ta del av den här.

- **Hur tänker du kring vikten av djup respons vid KLL-behandling? (ca 2 min)**
- **Hur involverar du patienten i valet av behandling? (ca 2 min)**
- **Hur ser du på framtiden inom KLL? (ca 2,5 min)**

## "The CD20-antibodies are still a key backbone of CLL-therapy, even when using targeted agents"

Othman Al-Sawaf, Tyskland

Se intervjun med doktor Othman Al-Sawaf, Köln, Tyskland när han diskuterar kring CD20-antikropparnas roll vid behandling av KLL. Missade du senaste OpenView webinaret där doktor Al-Sawaf höll en uppskattad föreläsning om ämnet, kan du ta del av den här.

- **The role of CD20 antibodies in CLL? (ca 2,5 min)**
- **Treatment of CLL patients with high-risk in the era of targeted agents? (ca 2 min)**
- **Treatment with targeted fixed treatment duration therapies or targeted continuous treatment therapies? (ca 2,5 min)**
- **The importance of deep responses in CLL? (ca 2,5 min)**

## Träffa oss på ASH i New Orleans

ASH går i år av stapeln i New Orleans 10-13 december. I år ser vi fram emot att få ta del av kongressen på plats i New Orleans. Hoppas att vi ses där!

**Jonas Ljunggren**
*District Manager KLL/AML*
ljunggren.jonas@abbvie.com
070-889 33 43

**Stefan Bjädefors**
*District Manager KLL/AML*
stefan.bjadefors@abbvie.com
073-097 62 46

### Dina kontakter på AbbVie



**Anna Lindh**
*Brand Manager KLL*
anna.lindh@abbvie.com
072-070 00 02

**Louise Jahnke Ask**
*Scandinavian Brand Manager AML*
louise.jahnkeask@abbvie.com
076-118 70 65

**Stefan Bjädefors**
*District Manager KLL/AML*
stefan.bjadefors@abbvie.com
073-097 62 46

**Jonas Ljunggren**
*District Manager KLL/AML*
ljunggren.jonas@abbvie.com
070-889 33 43

VENCLYXTO
venetoklax tabletter

VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har svikitat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. VENCLYXTO i kombination med ett hypometylerande läkemedel är avsett för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML) som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 22 mars 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) eller akut myeloisk leukemi (AML) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling mot KLL, som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har svikitat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg samt i kombination med ett hypometylerande läkemedel vid behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad AML som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi.

SE-VNCCLL-220016v1.0 2022



Du har fått detta e-postmeddelande då du tidigare uttryckt intresse för kommunikation ifrån AbbVie AB. Om du inte längre är intresserad av att ta emot information ifrån oss, eller om detta meddelande felaktigt skickats till dig, vänligen klicka här för att avsluta din prenumerationen eller för att hantera dina kommunikationspreferenser.

Mer information om hur AbbVie hanterar dina personuppgifter och rättigheter hittar du i vår integritetspolicy

**AbbVie AB,** Hemvärnsgatan 9 (besöksadress), Box 1523, 171 29 Solna, info@abbvie.se